

DOMINAL®

Zusammensetzung:

-forte 40mg/ -forte 80mg: 1 Drg./1 Filmtbl. enth.: Prothipendyl-HCl·1H₂O 40mg/80mg. Hilfsst.: mikrokrist. Cellulose, Mg-stearat, Maisstärke, Lactose-Monohydrat, hochdisp. Siliciumdioxid, Carmellose-Na, Talkum, Montanglykolwachs.
-forte 40mg zusätzl.: Saccharose, Macrogol 35000, Calciumcarbonat, Povidon, Polysorbat 20, Farbst. E 104, E 132.
-40mg Ampullen: 1 Amp. (2ml) enth.: Prothipendyl-HCl·1H₂O 40mg. Hilfsst.: max. 1,0mg Natriumsulfit H₂O-frei, max. 2,0mg Natriumdisulfit (entspr. max. 1,86mg SO₂), Ascorbinsäure, Essigsäure, Natriumhydroxid, Wasser f. Inj.-zwecke, Stickstoff.
-Tropfen: 10 Tropf. enth.: Prothipendyl-HCl·1H₂O 25mg. Hilfsst.: Sorbitollsg. 70% (nicht kristallis.), Sorbinsäure, Natriumsulfit H₂O-frei, Natriumdisulfit, Ascorbinsäure, Saccharin, Ethanol 96%, Vanillin, Pfefferminzöl, Natriumhydroxid, ger. Wasser.

Anwendung:

Endogene u. exogene Psychosen, Zerebralsklerose, Unruhe- u. Erreg.-zust., Einschlafstör., Narkosepotenzier., schwere Schmerzen (in Komb. mit Analgetika), juckende Dermatosen.
Zusätzl. f. - Tropfen: neurovegetative Regulat.-stör., psychomotor. Unruhe u. Verwirrth. sowie Konz.-schwäche bei Kdrn.

Gegenanzeigen:

Akute Intoxikat. mit zentraldämpf. Pharmaka u. Alkohol., komatöse Zust.
Zusätzl. f. - 40 mg Ampullen: Asthmatiker m. Sulfitüberempfindl.-keit.

Anwendungsbeschränkung:

Vorgeschäd. Herz, schwere Lungenfunkt.-stör., ausgeprägte Hypotonie, orthostat. Kreislaufregulat.-stör.

Nebenwirkungen:

Früh- u. Spätdyskinesien, parkinsonoid. Akathisie, orthostat. Regulat.-stör. (Hypotonie, Schwindelgefühl, Herzklopfen, Tachykardie), Mundtrockenh., Gewichtszun., Priapismus, Photosensibilisier.
Zusätzl. f. - 40 mg Ampullen: Überempfindl.-keitsreakt. (Brechreiz, Durchfall, Asthmaanfall, Bewusstseinsstör., Schock).

Wechselwirkungen:

Zentraldämpf. Pharmaka, Alkohol u. Antihypertonika: gg-seit. Wirk.-verstärk. Wirk. von Levodopa vermind. Verstärk. der Tox. v. Reserpin. Adrenalin u. Phenylephedrin: Antagonisier. der vasokonstriktiven Effekte. Bei Komb. von Neuroleptika u. Lithium Gefahr neurotox. Wirk. Dopaminagonisten (z.B. Dopamin, Bromocriptin). Wirk. der Agonisten abgeschwächt.

Hinweis:

Reakt.-vermögen kann beeinträcht. werden!

Dosierung:

Bei Ein- u. Durchschlafstör. 1-2 Drg. Dominal forte 40mg bzw. 1 Filmtbl. Dominal forte 80mg bzw. 16-32 Tropf. Dominal Tropfen. Kdr. 1 Tropf./kg/KG. Bei Erreg.- u. Verwirrth.-zust. zur Anf.-behandl. 3-4 x tgl. 1-2 Amp. Dominal 40 mg Ampullen i.m., zur Anschlussbehandl. 3-4 x tgl. 1-2 Drg. bzw. 1 Filmtbl. bzw. 32 Tropf., Kdr. 3-4 x tgl 1-2 Tropf./kg/KG. Zur Nakosevorbereit. 1-2 Drg. bzw. 1 Filmtbl. bzw. 16-32 Tropf., Kdr. 1 Tropf./kg/KG in der Nacht vor der Operat. bzw. 1 Amp. i.m. 45-60 min vor Einleit. der Narkose. Bei postoperat. Erbrechen Einmalgabe von 1-2 Drg. bzw. 1 Filmtbl. bzw. 16-32 Tropf. Bei juck. Hauterkrank. zur Nacht 1-2 Drg. bzw. 1 Filmtbl. bzw. 32 Tropf., Kdr. 1 Tropf./kg/KG. Zur Schmerzbehandl. in Komb. mit weit. schmerztherapeut. Maßn. 3 x tgl. 1-2 Drg. bzw. 1 Filmtbl. bzw. 16-32 Tropf. bzw. 1 Amp. i.m.